

COEXISTIENDO CON COYOTES

Los coyotes (*Canis latrans*) se encuentran en la mayor parte de California. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California estima una población de entre 250.000 y 750.000 animales. Los coyotes son muy adaptables y habitan en la mayoría de las áreas del estado con excepción de los centros de las principales áreas metropolitanas. Son animales de tamaño mediano pertenecientes a la familia de los perros. La mayoría de los adultos pesan entre 22 y 25 libras en promedio, siendo los machos el sexo más grande. Con orejas grandes y erguidas, hocico delgado y cola tupida, se parecen a un pequeño perro Collie. En las regiones más cálidas y secas de California, los coyotes son de color marrón tostado con vetas grises. En las zonas más montañosas o húmedas el color es más oscuro con menos marrón. En invierno, el pelaje se vuelve bastante denso, especialmente en las zonas más frías. La voz del coyote es bastante distintiva y consiste en varios aullidos, ladridos agudos y ladridos ocasionales parecidos a los de un perro. Los coyotes son depredadores competentes y poseen la velocidad, la fuerza y la resistencia necesarias para enfrentarse a presas tan grandes como los ciervos adultos.



BIOLOGÍA

En California, los coyotes se reproducen principalmente durante Enero, Febrero y Marzo. El período de gestación es de unos 60 a 63 días. Las crías nacen de Marzo a Mayo, con camadas de entre 5 y 6 crías en promedio. Los coyotes producen una camada por año. Las crías son destetadas a las 5-6 semanas y abandonan a sus padres a los 6-9 meses. La mayoría de los adultos se reproducen por primera vez en su segundo año. Los coyotes de un año que no se reproducen a menudo se quedan con los padres adultos y ayudan a cuidar a los cachorros. Las guaridas de coyotes se encuentran en orillas empinadas, grietas de rocas, sumideros y maleza. Las guaridas de los coyotes suelen ser agujeros que han sido utilizados por tejones, zorrillos, zorros u otros animales con entradas ampliadas hasta aproximadamente un pie de diámetro. Las madrigueras varían desde 4 a 5 pies de profundidad hasta 50 pies de profundidad. La dieta del coyote se compone principalmente de ratones, ratas, ardillas terrestres, tuzas, conejos y carroña. También comen insectos, reptiles, anfibios, frutas, aves y sus huevos y cervatillos de venado. En algunas zonas rurales de California, se alimentan en gran medida de ovejas, vacas y aves de corral.

En las zonas urbanas y suburbanas, la basura, los perros y gatos domésticos, otras mascotas, los animales domésticos y los alimentos para mascotas pueden ser alimentos importantes. Los coyotes son más activos en noche y durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde. En áreas donde no son perturbados por actividades humanas y durante las épocas más frías del año, pueden estar activos durante todo el día. Los coyotes urbanos se están volviendo muy tolerantes con las actividades humanas. Los coyotes jóvenes tienden a ser más activos durante las horas del día que los adultos.

DAÑO

Los coyotes pueden causar daños sustanciales. En las zonas rurales suelen matar ovejas, terneros y aves de corral. En algunas partes del estado causan daños a los sistemas de riego por goteo al hacer agujeros en las tuberías. En otras zonas causan daños considerables a las sandías, los cítricos y los aguacates. La seguridad de las aeronaves a menudo se ve comprometida cuando los coyotes se instalan en las pistas o cerca de ellas. También se sabe que los coyotes se alimentan de varias especies amenazadas o en peligro de extinción, incluido el zorro kit de San Joaquín y el charrán menor de California. En las zonas urbanas y suburbanas, los coyotes suelen capturar gatos domésticos, perros pequeños, aves de corral y otros animales domésticos. Se sabe que los coyotes atacan a los humanos.

ENFERMEDADES

El moquillo y la hepatitis canina se encuentran entre las enfermedades más comunes de los coyotes. La rabia y la tularemia también ocurren y pueden transmitirse a humanos y otros animales. Los coyotes suelen ser portadores de parásitos, incluidos ácaros, garrapatas, pulgas, gusanos y trematodos. Los ácaros, que causan la sarna sarcóptica, son un ectoparásito importante de los coyotes. El gusano del corazón es uno de los endoparásitos más importantes de la población de coyotes de California. Este parásito puede transmitirse a los perros domésticos a través de mosquitos.

PREVENCIÓN AL PROBLEMA

Los coyotes se sienten atraídos por las áreas urbanas/suburbanas por el fácil acceso a alimentos, agua y refugio. Reducir o eliminar la disponibilidad de estos elementos a menudo alentará a los coyotes a irse. Las tapas de los botes de basura deben estar aseguradas en todo momento o la basura debe almacenarse en el interior. Las mascotas deben ser alimentadas durante el día y toda la comida para mascotas debe retirarse antes de que oscurezca. Los tazones de agua deben vaciarse y no dejarse afuera después del anochecer. Las frutas y verduras maduras deben cubrirse por la noche o el jardín/árboles frutales debe encerrarse con una cerca a prueba de coyotes para evitar el acceso de coyotes hambrientos. Todas las frutas y verduras inesperadas deben recogerse diariamente. En áreas donde se ha documentado la depredación de mascotas, no se debe dejar afuera a los gatos y perros pequeños después del anochecer, a menos que estén encerrados en un recinto a prueba de coyotes. Nunca se debe dejar intencionalmente comida fuera para mamíferos salvajes. En áreas suburbanas donde se cría ganado como corderos, lechones, terneros o aves de corral y se ha documentado la depredación por coyotes, se deben tomar precauciones para evitar mayores pérdidas.

Para excluir a los coyotes, se deben construir cercas que tengan al menos 5 ½ pies de altura. Pueden estar hechos de madera maciza, bloques de cemento, ladrillo o alambre. Si se utiliza una cerca de alambre, la parte inferior debe tener al menos 3 ½ pies de alto con cuadrados de menos de 6 pulgadas. Si se utiliza una cerca de alta resistencia, se debe electrificar con un cargador de cerca para evitar que los coyotes la atraviesen. Todas las cercas deben tener algún tipo de delantal de alambre galvanizado enterrado al menos de 4 a 6 pulgadas en el suelo, que se extienda desde la cerca al menos de 15 a 20 pulgadas. El delantal debe estar firmemente sujeto a la parte inferior de la cerca. Los coyotes son excavadores muy expertos y prefieren cavar debajo de las cercas en lugar de saltarlas.

Se deben eliminar la maleza y la vegetación de los patios traseros y áreas adyacentes para eliminar el hábitat de las presas, que podrían atraer a los coyotes. El jardín debe podarse periódicamente. Estas acciones también eliminan el escondite utilizado por los coyotes para acechar a las mascotas domésticas. Si no se puede contener a los gatos en el interior y la depredación se considera un problema, se pueden instalar postes en áreas de espacios abiertos, que proporcionen un escape para los gatos. Estos postes deben tener al menos 7 pies de alto, estar hechos de material que el gato pueda trepar y tener suficiente espacio en la parte superior para que se siente.

Durante la época del año en que los coyotes adultos cuidan a sus crías (Mayo-Septiembre), pueden ser muy agresivos cuando sus crías se ven amenazadas. Los perros domésticos son especialmente vulnerables a los ataques durante este tiempo. Incluso los perros con correa han sido atacados cuando se han acercado demasiado a una familia de coyotes. En entornos urbanos donde se ha identificado una guarida, se debe tener precaución para mantener a los perros fuera del área. Estas áreas deben estar señalizadas y las personas preocupadas por ataques a sus perros deben evitar el área. Se puede esperar una mayor depredación de mascotas domésticas alrededor de las madrigueras, y los residentes deben tomar precauciones adicionales para proteger a los valiosos gatos domésticos o perros pequeños.



LEYES Y REGULACIONES

Las regulaciones del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California prohíben la reubicación de coyotes sin el permiso escrito del Departamento. Para obtener más información sobre el estatus legal de los coyotes y otros animales salvajes, comuníquese con la Oficina Regional del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON LA OFICINA LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE PESCA Y VIDA SILVESTRE DE CALIFORNIA O VISITE SU SITIO WEB
<https://www.wildlife.ca.gov/Living-with-Wildlife>

TAMBIÉN PUEDE VISITAR EL SITIO WEB DEL COMISIONADO AGRÍCOLA/PESOS Y MEDIDAS DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES
<https://acwm.lacounty.gov/>

ACWM CUBRE LAS ÁREAS NO INCORPORADAS DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES, ASÍ COMO SUS CIUDADES CONTRATAS.